





# Empleados con exposición conocida a una persona con COVID-19 confirmado

- El período de cuarentena de 14 días no se puede acortar para los que residen en una vivienda grupal o que trabajan con grupos de personas de alto riesgo.
- Todas las demás personas pueden hacer cuarentena (quedarse en sus hogares) durante 10 días desde la última exposición. Si no presenta síntomas al día 10, puede terminar la cuarentena, pero debería seguir atento por si surgen síntomas durante los siguientes 4 días.
- Considere hacerse la prueba de COVID-19 pero debe permanecer en su hogar durante el período de cuarentena INCLUSO si su prueba es negativa.




**Una prueba negativa de COVID-19 no significa que alguien que haya estado en contacto directo pueda terminar antes de tiempo con la cuarentena.**





# El empleado tiene síntomas preocupantes de COVID-19



El **empleado** tiene un resultado positivo para un **síntoma** en la evaluación Y no tiene **ninguna exposición conocida** a alguien con COVID-19 en los últimos 14 días:





Sus síntomas NO cumplen los criterios indicados a continuación.

¿Ha estado cerca de alguien que haya estado enfermo en los últimos 14 días?



**SÍNTOMAS PREOCUPANTES DE COVID-19:**  
**DOS** síntomas cualquiera de los siguientes:

- Fiebre (medida o subjetiva)
- Escalofríos
- Dolor en todo el cuerpo
- Dolor de cabeza
- Dolor de garganta
- Náuseas o vómitos
- Diarrea
- Fatiga
- Congestión o secreción nasal

Si **no** cumple estos criterios, siga las pautas mencionadas anteriormente.

**O**  
**UNO** de los siguientes:

- Tos
- Falta de aliento
- Pérdida del gusto o el olfato

Si una persona se hace una prueba PCR y obtiene un resultado positivo de COVID-19, pero NO tiene síntomas:

- No es necesario hacer una nueva prueba durante los 3 meses siguientes.
- No es necesario hacer cuarentena si la persona estuvo expuesta a alguien.
- Si la persona desarrollara síntomas preocupantes de COVID, la decisión de hacerse una prueba de COVID-19 deberá tomarse en cada caso entre el paciente y el médico.

